

## **SCHONE NAALD?**

Op dit moment wordt een groot gedeelte van de biggen in Nederland gevaccineerd. Meestal tegen 'Circo', vaak tegen Mycoplasma. En nu er binnenkort ook een vaccin op de markt komt dat niet alleen tegen Circo en Mycoplasma beschermt, maar ook tegen PRRS, zal waarschijnlijk een groot gedeelte van de biggen tegen drie kiemen geënt gaan worden.

Maar al dat vaccineren heeft ook nadelen, naast natuurlijk de kosten. Want met het vaccineren door middel van een injectie kan via de naald juist ook heel veel narigheid worden overgebracht.

Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat virusdeeltjes die tijdens een injectie aan een naald zijn blijven hangen, zelfs nadat vijf andere injecties ermee zijn uitgevoerd, nog steeds aantoonbaar zijn.

En het blijkt ook dat via een naald 1000 keer meer virusdeeltjes kunnen worden overgebracht dan via neus-neus contact wordt overgedragen.

Dat is natuurlijk een pleidooi om voor elk big die geïnjecteerd wordt een schone naald te gebruiken. Dat is echter in de praktijk volstrekt onwerkzaam. Maar het is wel een heel goed voornemen om in elk geval voor elk hok met biggen een andere naald te gebruiken.

Want vaccineren is mooi om de biggen te beschermen. Maar het moet er niet op uitdraaien dat hierdoor juist de biggen besmet raken.

## **WOENSDAG 14 OKTOBER**

Onlangs hebt u een uitnodiging gekregen voor een informatieavond van onze praktijken over PRRS. Op woensdagavond 14 oktober bent u vanaf 19.30 uur welkom in Zalencentrum Buitenlust in Voorthuizen.

Tijdens deze avond zijn er interessante sprekers die alle facetten van de bestrijding van PRRS belichten. Met name hetgeen u op uw eigen bedrijf kunt doen, krijgt veel aandacht.

De vaste lezer van deze nieuwsbrief begrijpt inmiddels wel dat PRRS een van de grootste ziektekundige uitdagingen voor de Nederlandse varkenshouderij is. Vandaar dat wij op onze jaarlijkse informatieavond daar aandacht aan schenken.

U bent van harte welkom.

## **EERDER SPENEN**

We horen het nog wel eens: omdat de vrachtwagen met slachtzeugen toch al op het bedrijf is, worden ook de voor afvoer bestempelde zeugen uit de kraamstal meegegeven.

De biggen van deze zeugen worden dan wat eerder gespeend dan de andere toompjes in die kraamafdeling, maar ze blijven nog wel in hun kraamafdeling.

Dat is een situatie waar dierenartsen geen voorstander van zijn. Het spenen van biggen levert voor die dieren veel stress op. Moeders is plotseling weg en dan moet er ook opeens ander voer gegeten worden.

Wanneer dieren onder stress staan, verzwakt dat hun weerstand aanzienlijk. Daardoor krijgen infecties als PRRS (daar heb je hem weer) of Circo plotseling alle ruimte.

En als door de stress verzwakte biggen geïnfecteerd worden, gaan ze ook veel kiemen verspreiden. Daardoor ontstaat er een flinke brandhaard van infecties in die kraamafdeling. En nergens op een vermeerderingsbedrijf wil je brandhaarden hebben, maar zeker niet in de kraamstal.

Natuurlijk moeten alle biggen een keer gespeend worden. Maar dan heb je het liefst dat de brandhaard van infecties die dat oplevert, zoveel mogelijk wordt afgezonderd op het bedrijf. Daarvoor is de gespeendebiggenafdeling. Wij adviseren dus met kracht om een gehele kraamafdeling op één moment te spenen. En om gespeende biggen zoveel mogelijk in een aparte (gespeendebiggen-)afdeling te huisvesten.