

PIA

PIA is een aandoening waarmee varkensartsen bijna dagelijks worden geconfronteerd. Deze aandoening komt nog steeds veel voor bij vleesvarkens.

We kennen zowel een acute als een chronische vorm. De acute vorm zien we vooral bij zware varkens net voor het afleveren.

De ziekte kenmerkt zich door zeer bleke varkens en een hok dat besmeurd is met zwarte mest. In de meeste gevallen is een dood varken het eerste wat de varkenshouder ervan ziet.

Heel snel handelen door een injectie met Tylan of Oxytetracycline toe te dienen, kan heel soms het leven van een bleek varken redden. Meestal komt die echter te laat. Als het varken bleek is, en zeker als er zwarte mest te zien is, zijn de darmen al een bloederig geheel, wat nooit meer goed kan herstellen.

De chronische vorm levert het beeld op van achterblijvende varkens. De technische cijfers als voederconversie en groei vallen in dat geval tegen. Maar de verschijnselen zijn niet heel duidelijk. Het is meer een algemeen beeld van varkens die het niet heel goed doen.

Tegen de chronische vorm is te vaccineren. Het vaccin moet oraal worden toegediend, bij voorkeur enkele weken voordat de varkens geïnfecteerd raken.

Dat betekent dat er bloedonderzoek moet worden gedaan om het bedrijfsspecifieke infectiemoment te bepalen.

Tegen de acute vorm werkt de vaccinatie helaas niet of nauwelijks. De meeste problemen met acute PIA zien we op bedrijven waar de varkens even wat minder gegeten hebben. Bijvoorbeeld door het nuchter houden bij het afleveren van hokgenoten. Het kan ook gebeuren bij een infectie van een griepvirus, waardoor de varkens even wat minder eten.

Meer in het algemeen gesproken lijkt het erop – er is geen hard wetenschappelijk bewijs – dat een verstoring van de darmflora de kans op het ontstaan van PIA aanzienlijk vergroot.

De verstoring van de darmflora kan ook plaatsvinden bij varkens die veel hoogwaardig voer opnemen en mede daardoor snel groeien. Op sommige bedrijven met PIA-problemen werkt het dan ook om het voer iets meer structuur te geven en het aandeel energie en eiwit wat te verkleinen. Het voordeel hiervan is dat de darmgezondheid kan verbeteren. Het nadeel kan echter zijn dat de varkens minder hard groeien. De gevolgen van PIA zijn dus te verkleinen door een genuanceerde afweging te maken tussen darmgezondheid en groei.

VARKENSPOST.NL

Enkele maanden geleden heeft de IKB-organisatie van DGB via een mail bekendgemaakt dat er een speciaal door DGB ontworpen 1:1-overeenkomst tussen dierenarts en varkenshouder moet worden getekend. Wij hebben daarover al eerder in onze nieuwsbrief geschreven.

Het is lastig dat we deze nieuwe 1:1-overeenkomst samen met onze varkenshouders moeten ondertekenen, want we moeten voor de organisatie die varkensartsen controleert weer een andere 1:1-overeenkomst samen met u ondertekenen. Dubbel werk dus!

Daarnaast stelt DGB dat de varkenshouders deze nieuwe 1:1-overeenkomst moeten downloaden via hun account bij varkenspost.nl. En daar moet ook het meest actuele bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan geüpload worden.

Als gevolg van deze nieuwe eis constateren toetsers van Producert vaak tekortkomingen tijdens IKB-inspecties bij onze varkenshouders. We adviseren u dan ook om voor de IKB-inspectie uw account bij varkenspost.nl te controleren op de aanwezigheid van de juiste 1:1-overeenkomst, bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan.

Varkensbedrijven die door een inspecteur van Verin worden getoetst op de IKB-eisen, hebben hiervan geen last.